

Grade der Asthmakontrolle bei Kindern und Jugendlichen (nach NVL 2020)

Grade der Asthmakontrolle		Gut kontrolliert	Teilweise kontrolliert	Unkontrolliert
Symptomkontrolle	In den letzten 4 Wochen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptome tagsüber</li> <li>• nächtliches Erwachen durch Asthma</li> <li>• Gebrauch von Bedarfsmedikation<sup>1</sup></li> <li>• Aktivitätseinschränkung durch Asthma</li> </ul>	kein Kriterium erfüllt	1–2 Kriterien erfüllt	3–4 Kriterien erfüllt
Beurteilung des Risikos für eine zukünftige Verschlechterung	Erhebung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungenfunktion (Vorliegen einer Atemwegsobstruktion)</li> <li>• Anzahl stattgehabter Exazerbation (keine/1 x im Jahr/in der aktuellen Woche)</li> </ul>			

<sup>1</sup> Bei Patient\*innen ab 12 Jahren, die in Stufe 2 ausschließlich die Fixkombination (ICS niedrigdosiert und Formoterol) bedarfsweise anwenden, ist das Kriterium nicht anwendbar: Bei gut kontrolliertem Asthma wird die Fixkombination nicht häufiger als zweimal pro Woche angewandt.