

## Vergleichstabelle der Dosierungen inhalativer Kortikosteroide (ICS) für Erwachsene

Wirkstoff	Niedrige Dosis (µg)	Mittlere Dosis (µg)	Hohe Dosis (µg)	Höchstdosis <sup>1</sup>
Beclometasondipropionat (BDP), Pulver zur Inhalation	200–500	> 500–1.000	> 1.000	≥ 2.000
Beclometasondipropionat (BDP), Dosieraerosol	100–200	> 200–400	> 400	≥ 1.000
Budesonid	200–400	> 400–800	> 800	≥ 1.600
Ciclesonid	80	160	≥ 320	≥ 320
Fluticasonfuroat	100	100	200	200
Fluticasonpropionat	100–250	> 250–500	> 500	≥ 1.000
Mometasonfuroat	200	400	> 400	≥ 800

<sup>1</sup> Dosierungsempfehlungen gemäß ERS/ATS-Empfehlung bei schwerem Asthma bzw. in der Stufe 5 des Stufenschemas

Es handelt es sich nicht um eine Dosieranleitung. Die Tabelle gibt Hinweise, welche Dosierungen für die einzelnen Wirkstoffe in welchen Dosierungsbereich fallen, und soll helfen, von einem Wirkstoff auf einen anderen zu wechseln. Teilweise weichen die Dosisangaben stark von Fachinformationen und damit von der Zulassung ab.

Quelle: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). Nationale Versorgungsleitlinie Asthma. 4. Auflage, Stand 2020.