

COVID-19, Impfschema für die Grundimmunisierung

Impfstoff	Empfohlene Altersgruppe	Empfohlener Impfabstand
Comirnaty (BioNTech/Pfizer)	ab ≥ 5 Jahre (5–11 Jahre mit reduzierter Dosierung (10 µg) ≥12 Jahre (30 µg)	3–6 Wochen
Spikevax (Moderna)	ab ≥ 30 Jahre (100 µg)	4–6 Wochen
Vaxzevria (AstraZeneca)	ab ≥ 60 Jahre	9–12 Wochen
Nuvaxovid (Novavax)	≥ 18 Jahre	ab 3 Wochen
Janssen (Janssen Cilag International)	ab ≥ 60 Jahre	ab 2 Monaten
Heterologes Impfschema (Vaxzevria/mRNA-Impfstoff)	alle einmalig mit Vaxzevria geimpften Personen, unabhängig vom Alter	ab 4 Wochen
Heterologes Impfschema (Janssen (Janssen Cilag International)/mRNA-Impfstoff oder Nuvaxovid)	Janssen (ab ≥ 60 Jahre); zweite mRNA-Impfstoffdosis unabhängig vom Alter oder zweite Nuvaxovid- Impfstoffdosis ≥ 18 Jahre	ab 4 Wochen

Quelle: RKI – COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (<https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html>), Stand 19.03.2022