

Diagnostische Kriterien bei multipler Sklerose (McDonald-Kriterien 2017)

Zahl der Schübe	Objektive Läsionen	Erforderliche Zusatzkriterien
≥ 2	≥ 2	keine
≥ 2	1	räumliche Dissemination (DIS): weiterer Schub mit objektiver Läsion oder DIS-Kriterien im MRT erfüllt
1	≥ 2	zeitliche Dissemination (DIT): weiterer Schub oder DIT-Kriterien im MRT erfüllt oder oligoklonale Banden im Liquor
1	1	DIS und DIT
Klinisch isoliertes Syndrom (KIS)		DIS-Kriterien im MRT erfüllt
Primär progrediente multiple Sklerose (PPMS)		<p>Klinische Progression über mindestens 1 Jahr (prospektiv oder retrospektiv) und zwei der folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. eine T2-hyperintense Läsion in mindestens einem der Areale periventrikulär, kortikal/juxtakortikal oder infratentoriell • mind. zwei T2-hyperintense Läsionen spinal • oligoklonale Banden im Liquor

Quelle: Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17: 162-73. PMID: 29275977